

# INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU



W związku z zagrożeniem wystąpienia w Polsce

## **WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW** HODOWCY DROBIU

**POWINNI ZACHOWYWAĆ  
SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ  
I STOSOWAĆ ODPOWIEDNIE ŚRODKI BIOASEKURACJI**

minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków  
do gospodarstwa, w szczególności:

1. Przechowywać drób na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
2. Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
3. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.

**Hodowco !!!**

**Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie  
do odpowiednich osób i instytucji  
(lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii,  
wójt/burmistrz/prezydent miasta)  
podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu**

**Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu**

Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezdolność ruchów; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności